

“ L'Echange ”, Revue Linnéenne

Numéro spécial

M. PIC, Rédacteur

Opuscula martialis

III

(28 Juin 1941)

MOULINS

“ LES IMPRIMERIES RÉUNIES ”

15, RUE D'ENGHien, 15

Ce nouveau fascicule contient, comme les précédents, des nouveautés de *Cœoptères* dont les *types* se trouvent dans ma collection. Les désignations des familles sont mises en abrégé. Les fascicules *Op. Martialis* sont vendus par l'auteur.

Zonabris Crampeli n. sp. [Hét.]. Subopacus, griseo aut fusco pilosus, niger, elytris antice late rufis, ad basin intus et ad suturam antice nigro marginatis, antennis rufis, ad basin piceis. Long. 17 mill. Fort Crampel. — Voisin de *Gestroi* Pic, plus opaque avec les élytres non fasciés de clair postérieurement.

Z. singularefasciata n. sp. Subopacus, fusco pilosus, niger, elytris luteis, ad scutellum paulo et apice sat late nigris, ante et post medium sinuate et angulate nigro fasciatis, fascia 1^a ad humeros remota. Long. 13 mill. Le Cap. — Voisin de *lacerata* Pér., dessins noirs des élytres différents et particuliers.

Zonabris gabonica Pic. A distinguer les variétés suivantes, du Gabon. En plus des deux bandes antérieures raccourcies, les élytres ont une macule supplémentaire en dessous de la bande discale (*v. interrogationis*) ; bande et macule jointes (*v. ininterrogationis*). Les bandes longitudinales sont jointes et flanquées de macules postérieures (*v. Favareli*). Les élytres ont, vers le milieu, et avant le sommet, en plus des bandes normales antérieures, deux rangées transversales de macules jaunes (*v. postluteomaculata*).

Coryna curvataelineata n. sp. [Hét.]. Parum nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in singulo luteo signatis : linea basalis reducta arcuata et paulo caudata, ad et post medium interne reducte fasciatis aut transverse maculatis, infra humeros luteo notatis, ante et post medium externe arcuate maculatis ; antennis rufis, ad basin ni-

gris. Long. 15 mill. Usambara. — Voisin de *parenthesis* Gerst., ainsi que le suivant.

C. basilineata n. sp. Parum nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in singulo luteo signatis : linea basalis parum elongata et paulo obliqua, fascia reducta mediana, maculis presuturalis irregularis et postmediana interna, externe linea marginalis reducta, postice intus prolongata, fascia postmediana arcuata. Long. 16 mill. Nakuru.

C. tortuosa n. sp. Parum nitidus, griseo pubescens et paulo nigro hirsutus, niger, elytris in singulo luteo signatis : linea lateralis post medium prolongata, macula basalis et fascia mediana reducta pro parte junctis, fascia antecapitalis interrupta. Long. 15 mill. Usambara. — A placer près de *Deckeni* Gerst, ainsi que le suivant.

C. signata n. sp. Nitidus, griseo pubescens et nigro hirsutus, niger, elytris luteis, apice nigris, in singulo signaturis nigris ornatis : sutura pro parte, fascia angustata basalis, macula transversa suturalis et macula externa transverse dispositis, macula minuta suturalis et fascia reducta bidentata transverse dispositis ; antennis nigris, apice rufis. Long. 14 millè Abyssinie.

C. Deckeni Gerst. Varie : elytres noirs à fascies jaunes sinuées et largement maculées de jaune en avant, la macule se joignant à la fascie médiane (*v. bijuncta*) ; la fascie jaune postmédiane est complète (*v. unijuncta*). Afr. Or.

C. Kersteni Gerst. A distinguer les var. suivantes, d'Afr. Or. Les deux macules voisines de chaque élytre étant réunies, présentent une bande jaune soit médiane (*v. unifasciata*), soit postérieure (*v. postunifasciata*), ou par la réunion de 4 macules 2 à 2, ainsi avec deux bandes jaunes, soit les antérieures (*v. basibifasciata*), soit les postérieures (*v. postbifasciata*). La var. *completefasciata* possède 3 bandes jaunes, au lieu de six macules.

C. 7-signata n. sp. Nitidus, griseo pubescens, niger, elytris in singulo septem luteo signatis, intus longitudinaliter 4 maculis diversis, externe trisignatis : linea reducta infrahumeralis, macula transversa antemediana, fascia postmediana reducta et obliqua ; antennis rufis, ad basin nigris. Long. 9 mill. Afr. Or. — Caractérisé par la disposition particulière des dessins jaunes.

C. rufonotata n. sp. Parum nitidus, griseo pubescens, niger, elytris, apice excepto, lateraliter luteo marginatis et in singulo antice longitudinaliter et ad medium transverse luteo maculatis, post medium luteo sinuate fasciatis et paulo rufo notatis ; antennis rufis, ad basin nigris. Long. 16 mill. : Dar es Salaam. — A placer près de *apicornis* Guer.

C. brevior n. sp., d'Afr. Or., voisin du précédent, s'en distingue par les élytres plus courts et la bordure jaune n'atteignant pas la fascie postérieure jaune. Parfois la fascie postérieure est interrompue (var. *postdivisa*).

C. latemaculata n. sp., du Kilimandjaro, est court et robuste, peu pubescent, brillant et possède les dessins jaunes suivants : une grande macule basale, deux fascies transversales sinuées et une bordure latérale assez large, de la base à la 1^{re} fascie.

Glipa insignata [Hét.]. Parum elongatus, postice paulo attenuatus, niger, pro parte iridescent, insignatus, griseo-luteo pubescens, labro et antennis ad basin testaceis. Long. 5,5 mill. Tonkin. — Caractérisé par l'absence de dessins sur les élytres.

G. rectefasciata n. sp. Angustatus et elongatus, niger, pro parte iridescent, antennis pedibusque anticis testaceis, capite, thorace elytrisque ad basin luteo pubescentibus, elytris griseo trifasciatis, fascia prima sinuata, alteris fere rectis, pro parte ad suturam junctis. Long.

10 mill. Tonkin. — Caractérisé par les fascies presque perpendiculaires à la suture.

G. luteobasalis n. sp., de Cochinchine, voisin du précédent, a la base des élytres pubescente de jaune, cette pubescence encerclant sur chaque une macule discale noire et possède, vers le milieu, deux fascies blanches, la 1^{re} oblique, la 2^e sinuée, réunies sur la suture, en plus une macule antéapicale grise.

G. separata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, griseo pubescens ; thorace dense pubescente et glabro maculato ; elytris in singulo signaturis griseis ornatis ; fascia semiarcuata ad scutellum prolongata, fascia obliqua postmedia, fascia arcuata preapicalis. Long. 7-8 mill. Tonkin. — Voisin de *malaccana* Pic, mais fascies, vers le milieu, non jointes sur la suture.

G. formosana v. n. *laterufa*. Dimidio basalis elytrorum rufo, his postice nigris, fasciis posticis griseis fere rectis. Formose.

Mordella Tonzalini n. sp. [Hét.]. Angustatus, subparallelus, niger, pro parte dense albo pubescens ; thorace transverse griseo fasciato et reducte longitudinaliter griseo bilineato ; elytris in singulo signaturis griseis ornatis : linea reducta presuturalis, antice maculis tribus oblique dispositis, fascia postmedia antice incisa. Long. 5 mill. Chine. — La *v. hoanensis*, du Tonkin, a la ligne plus ou moins interrompue et pas de macule latérale.

M. infrasignata n. sp. Sat robustus, elongatus, postice attenuatus, niger, infra corpore lateraliter signaturis albis distinctis ornato. Long. 7 mill. Tonkin. — Diffère de *binhana* Pic par les signes blancs argentés du dessous du corps.

M. insignata n. sp. Minutus, elongatus, postice attenuatus, niger, fere uniformiter pubescens, scutello gri-

seo pubescente. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *postimpressa* Pic.

M. latipennis n. sp. Oblongo-elongatus, sat robustus, luteo-griseo pubescens, niger, antennis pedibusque anticus pro parte rufis. Long. 3,5 mill. Tonkin. — Par sa forme et coloration, voisin de *robusta* Pic, mais ce dernier n'a pas un revêtement uniforme sur les élytres, qui ont la suture pubescente, sauf à l'extrémité, et deux bandes, l'antérieure large un peu arquée, la postérieure étroite, presque droite.

M. quelpaertensis n. sp. Grandis, elongatus, postice attenuatus, niger, signaturis griseo-luteo ornatus, thorace transverse et longitudinaliter lineato pubescente ; elytris in singulo antice in disco fascia sinuata ad basin remota et ad suturam post scutellum prolongata, macula mediana communis, macula lata anteapicalis antice paulo incisa ; abdomine lateraliter luteo aut albo notato. Long. 10 mill. Ile Quelpaert. — Caractérisé par la particulière fascie antérieure des élytres.

M. trinotata n. sp. Elongatus, postice valde attenuatus, nitidus, niger, thorace transverse luteo bifasciato et elytris in singulo luteo trimaculatis, maculis longitudinaliter dispositis. Long. 8 mill. Java. — Près *luteomaculata* Pic, mais le dessin maculiforme des élytres est réduit à 3 macules.

Mordella luteosignata n. sp. Sat robustus, postice attenuatus, niger, luteo signatus ; thorace transverse pro parte interrupte luteo fasciato ; elytris in singulo luteo sex maculatis : macula infra humeros, maculis 2 anticus obliquis, macula presuturalis antemediana, maculis duabus post medium. Long. 7 mill. Bornéo. — Voisin du précédent.

M. diversepubens n. sp., de Bornéo, voisin du précédent, avec les élytres moins longs, est caractérisé par ses

macules pubescentes grises ou jaunes, le thorax a des bandes transversales et des lignes longitudinales grises, les élytres n'ont pas de macule discale postmédiane, mais, par contre, ont une bande basale interne grise.

M. lacsonensis Pic, du Tonkin, varie par les élytres ayant chacun 4 macules blanches, dont une prescutellaire, longitudinalement disposées (var. *prescutellaris*), ou ayant seulement 3 macules, la prescutellaire étant oblitérée (*v. Coomani*).

M. palembanga n. sp., de Sumatra, a les dessins de *lacsonensis* Pic, mais la forme est plus robuste, la taille plus petite, le thorax a 2 lignes longitudinales complètes grisâtres et les macules sont d'un gris sale.

M. Corporaali n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, supra pro parte griseo-luteo notatus, infra corpore pro parte albo et luteo pubescente ; thorace transverse fasciato et longitudinaliter reducte lineato ; elytris in singulo signaturis griseo-luteo ornatis : macula transversa presuturalis, fascia externa sinuata infrahumeralis, macula mediana presuturalis, macula anteapicalis. Long. 6 mill. Sumatra. — Voisin du précédent avec les dessins des élytres différents.

M. javana n. sp. Angustatus, postice attenuatus, niger, supra uniformiter griseo-fulvo pubescens, infra corpore pro parte argenteo pubescente. Long. 5 mill. Java. — Peut se placer près de *atroapicalis* Pic.

M. arcuatefasciata n. sp. Elongatus, postice attenuatus, niger, thorace pro majore parte nigro, ad basin griseo fasciato, elytris in singulo ad basin arcuate griseo-fasciatis, fascia posticé undulata, fascia grisea postmediana sinuata, macula grisea oblonga anteapicalis ad suturam posita. Long. 5,5 mill. Bornéo. — Caractérisé par la 1^{re} bande particulière, en forme de demi-cercle sur la suture et sinuée postérieurement.

M. niasensis n. sp. Suboblongus, robustus, niger, paulo iridescens, pro parte fulvo pubescens, antennis pedibusque anticus, intermediis pro parte testaceis. Long. 4 mill. Ile Nias. — A placer près de *curta* Pic.

M. nigripes n. sp., de Célèbes, voisin du précédent, un peu moins robuste, est noir à pubescence fauve et les pattes sont entièrement foncées.

M. Waterstradi n. sp. Oblongo-elongatus, niger, paulo iridescens, pro parte luteo aut fulvo pubescens, elytris postice vase et anguste fulvo-luteo fasciatis, antennis ad basin, femoribus 4 anticus diverse testaceis. Long. 3 mill. Banguey. — Voisin du précédent.

M. batjanensis n. sp. Elongatus, niger, paulo iridescent, pro parte griseo pubescens, elytris ad humeros lineato griseo pubescens et post medium in disco oblongo griseo maculatis, membris pro parte testaceis. Long. 3 mill. Batjan. — Moins robuste que *celebensis* Pic, avec les élytres non teintés de roux par places. La *v. roonensis*, de Roon, a les dessins gris des élytres maculiformes, non oblongs.

M. binotata n. sp., de Sumatra, allongé, noir, a, en dessous des épaules, une macule jaunâtre pubescente de gris et le dessous du corps est en partie pubescent de gris avec quelques macules latérales nettes.

M. Kannegieteri n. sp. Angustatus, postice paulo attenuatus, niger, argenteo aut fulvo pubescens ; thorace albo pubescente, postice fulvo trinotato ; elytris pro parte fulvo, pro parte argenteo pubescens et infra corpore fulvo et argenteo pubescente. Long. 5 mill. Preanger. — Voisin de *atropicalis* Pic.

M. micacea n. sp. Elongatus, subparallelus, postice paulo attenuatus, niger, griseo pubescens, supra distinete

sparse albo pilosus, antennis ad basin rufis. Long. 3,5 mill. Chine. — Voisin de *banahaosa* Pic, plus parallèle avec un autre revêtement pubescent.

M. nigroapicalis n. sp. *Angustatus*, postice attenuatus, griseo pubescens, niger, elytris rufis, apice nigris, ante apicem albo fasciat, sutura nigra, infra corpore laterali ter albo notato. Long. 6 mill. Brésil. — Espèce caractérisée par sa forme allongée jointe à sa particulière coloration élytrale.

M. variesignata n. sp. *Elongatus*, postice paulo attenuatus, griseo pubescens, niger, thorace elytrisque intus albo vittatis, his apice luteo maculatis. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin du précédent et caractérisé par son dessin particulier.

M. auratonotata n. sp. *Parum robustus*, postice attenuatus, griseo pubescens, niger, scutello albo pubescente, segmento 1° abdominis lateraliter aurato notato. Long. 7 mill. Pérou. — Peut se placer près de *tristicula* M.

M. varienotata n. sp. Valde angustatus, griseo pubescens, niger, capite antice, thorace lateraliter, antennis ad basin et femoribus 4 anticis testaceis, elytris in singulo luteo signatis : fascia subbasalis sinuata, ad humeros remota, macula discoidalis postmediana. Long. 4 mill. Guyane Fr. — Caractérisé par sa forme très allongée jointe à ses dessins élytraux.

Mordellistena Gounellei n. sp. [Hét.]. *Elongatus*, fulvo pubescens, rufescens, pro parte obscurus, membranis testaceis, tibiis posticis tristrigosis et articulo 1° tarsarum 4 strigosis. Long. 5 mill. Brésil.

M. unistrigosa n. sp. *Angustatus*, griseo pubescens, niger, antennis pedibusque anticis pro parte rufis, tibiis

posticis et articulo primo tarsarum longitudinaliter unistriatis. Long. 8 mill. Cayenne. — Très caractérisé par les tibias postérieurs n'ayant qu'une longue hachure disposée longitudinalement.

M. diversestrigosa n. sp., du Mexique, analogue au précédent, a une pubescence fauve sur les élytres, les tibias postérieurs ont une hachure un peu courbée au sommet avec une arête lisse sur le dos, le 2^e article des tarses à 2 lignes longitudinales brillantes.

M. palembanga n. sp. Grandis, elongatus, griseo-fulvo pubescens, niger, elytris apice rufo tinctis, antennis pedibusque anticus rufis, tibiis posticis 4 strigosis, articulo 1^o tarsarum oblique bistrigoso. Long. 8 mill. Sumatra. — Voisin de *pelecotomoidea* Pic, plus foncé, avec le premier article des tarses ayant une hachure en moins.

M. maxima n. sp., de Bornéo, semblable au précédent, se distingue, à première vue, par les tibias postérieurs munis de trois hachures seulement.

M. bangueyensis n. sp. Elongatus, fulvo pubescens, niger, antennis pedibusque 4 anticus pro parte rufis, tibiis posticis et articulo 1^o tarsarum quinque strigosis. Long. 4,5 mill. Banguey. — Voisin des précédents avec les hachures plus nombreuses.

M. tristrigosa n. sp. Elongatus, sat uniformiter non dense luteo-fulvo pubescens, niger, antennis pedibusque 4 anticus diverse testaceis, tibiis posticis oblique tristrigosis. Long. 4 mill. Tonkin. — Voisin de *binhana* Pic, mais avec les tibias n'ayant que 3 hachures.

M. humerosignata n. sp. Elongatus, postice paulo attenuatus, pro parte luteo pubescens, niger, elytris ad humeros luteo notatis, sutura pubescens, membris pro parte testaceis, tibiis posticis oblique 4-strigosis. Long. 5 mill. Tonkin. — Voisin de *infrarufa* Pic,

M. Petaini n. sp. *Angustatus*, postice paulo attenuatus, uniformiter, sat dense luteo-fulvo pubescens, rufus, abdomen apice pygidioque pro parte piceis, tibiis posticis oblique strigosis. Long. 5,5 mill. Tonkin. — Voisin du précédent.

M. Darlani n. sp. *Angustatus*, postice attenuatus, luteo pubescens, niger, thorace, pectore pro parte et femoribus ad basin rufis, elytris rufis, externe antice luteo nigro vittatis, sutura nigra, tibiis posticis tristrigosis. Long. 4 mill. Tonkin. — Peut se placer près de *Dohertyi* Ric.

M. piceopyga n. sp. *Minutus*, *angustatus*, luteo pubescens, rufo-testaceus, abdomen apice pygidioque piceis, membris testaceis, tibiis posticis oblique nigro tristrigosis. Long. 3 mill. Tonkin. — Voisin de *testaceicolor*, avec le sommet de l'abdomen et le pygidium plus foncés.

M. minuscula n. sp. *Minor*, *angustatus*, griseo-holosericeo pubescens, testaceus, tibiis posticis vague et reducte tristrigosis. Long. à peine 2 mill. Tonkin. — Voisin du précédent.

M. bistrigosa n. sp. *Minutus*. *angustatus*, griseo pubescens, rufo-testaceus, tibiis posticis nigro bistrigosis, striga prima longissima. Long. 2 mill. Tonkin. — Ressemble au précédent, les hachures des tibias sont différentes.

Dereutes rufipes n. sp. [Cler.]. *Elongatus*, sat angustatus, pubescens, nitidus, nigro-subæneus, elytris ad medium oblique flavo fasciatis, apice breve flavo maculatis, pedibus rufis, femoribus diverse brunneo aut piceo notatis, tibiis posticis pro parte piceis. Long. 6 mill. Chili. — A placer près de *analis* Ph., qui a les pattes foncées.

D. bilineatus n. sp. *Elongatus*, pubescens, nitidus, rufus aut luteus, pro parte brunneus, capite nigro notato, thorace reducte nigro vittato, elytris post medium externe

brunneo notatis. Long. 7 mill. Chili. — Voisin de *luridipennis* Ch., mais avant-corps à dessins foncés.

D. elongatus n. sp. Angustatus, nitidus, pubescens, luteus, capite lato, nigro metallico, antice flavo ; thorace pro parte piceo, medio impresso ; elytris elongatis, pro parte striatis, diverse punctatis, luteis, signaturis brunneis diversis ornatis ; infra corpore nigro maculato. Long. 6 mill. Chili. — Peut se placer près de *frigidus* Ch.

Olesterus micans (Sch.) n. sp. [Cler.]. Angustatus, niger, elytris vase cyaneis, ad medium anguste albo elevato fasciatis ; thorace elongato, postice strangulato, dense punctato ; elytris ad basin, in disco paulo elevatis, fortiter pro parte lineato punctatis, postice irregulariter et paulo punctatis, ad medium paulo strangulatis ; scutello et membris rufis. Long. 8 mill. Australie. — Très caractérisé par sa sculpture élytrale et ses bandes surélevées.

O. bifasciatus n. sp. Elongatus, parum nitidus, niger, elytris ad humeros, ad medium et apice rufis, sutura rufa, ad medium et ante apicem albo fasciatis, membris pro parte rufis ; pro parte brunneis. Long. 6 mill. Nouvelle-Calédonie. — Caractérisé par sa coloration particulière et les deux fascies des élytres.

Scrobiger albosignatus n. sp. [Cler.]. Elongatus, postice attenuatus, nigro-cyanescens, antennis testaceis ; thorace supra medio excavato et paulo bigibbuloso, ad basin albo marginato ; elytris ad medium reducte arcuate et oblique albo fasciatis, apice et ad suturam postice albo pubescente marginatis. Long. 11 mill. Australie. — Caractérisé par la bordure pubescente blanche du sommet des élytres.

Eleale alboapicalis n. sp. [Cler.]. Oblongo-elongatus, nitidus, æneus, pro parte dense albo pubescens, antennis rufis, apice nigris ; capite elongato, pupillato punctato ;

thorace elongato, antice et postice strangulato, diverse punctato et breve plicato, postice externe albo notato ; scutello albo ; elytris sat brevibus, apice deflexis et albo notatis, punctatis et granulosis. Long. 8 mill. Australie. — Voisin de *pulchra* New., distinct par l'absence de fascie jaune.

E. femoralis n. sp. Parum elongatus, nitidus, albo pubescens et fusco hirsutus, viridescens, supra pro parte purpureus, antennis obscuris ; elytris fortiter punctatis, ad basin et apice paulo punctatis et nitidioribus ; scutello albo ; articulo ultimo antennarum lato, apice subtruncato ; femoribus posticis valde dilatatis. Long. 11 mill. Australie. — Voisin de *simplex* New., caractérisé par ses grosses cuisses postérieures et les antennes foncées.

E. parallelcollis n. sp. Angustatus, parum nitidus, albo pubescens et fuscohirsutus, parum fortiter punctatus, viridis, supra pro parte cupreus, elytris lateraliter purpureo marginatis, antennis apice piceis, articulo ultimo truncato et paulo emarginato ; thorace elongato, postice angustiore ; pedibus purpureis. Long. 9 mill. Australie. — Voisin de *cibrata* Sch. avec le thorax autrement conformé.

E. inlimbata n. sp., d'Australie, voisin du précédent, avec une coloration analogue, mais sans marge pourprée, est un peu plus grand, le thorax est un peu élargi vers le milieu, les élytres ne sont pas subparallèles, le dernier article des antennes est tronqué droit.

E. particularis n. sp. Elongatus, parum nitidus, pro parte dense albo pubescens, viridescens, pro parte purpureo tinctus ; articulo ultimo antennarum transverso, valde inciso, externe angulato ; thorace parum elongato, antice et postice attenuato. Long. 10-11 mill. Australie. — Voisin de *cibrata* Sch., caractérisé par le dernier article des antennes ayant la forme d'un croissant.

E. cyanea n. sp. Angustatus, albo pubescens et fusco hirsutus, nitidus, cyaneus, scutello albo ; articulo ultimo antennarum parum lato, apice paulo inciso ; thorace parum elongato, lateraliter subarcuato, pro parte plicato ; elytris postice attenuatis, fortiter et irregulariter punctatis. Long. 8 mill. Australie. — Près de *herbacea* Ch., en diffère par sa coloration bleue.

E. plicatithorax n. sp. Angustatus, nitidus, parum pubescens, viride cupreus, antennis rufescentibus, articulo ultimo valde transverso, apice arcuate inciso ; thorace angustato, cylindrico, supra minute plicato ; elytris parum elongatis, parallelis, sat fortiter punctatis. Long. 6 mill. Australie. — Peut se placer près de *sinaragdina* Ch.

Agathomerus atripes n. sp. [Phy.]. Oblongo-elongatus, nitidus, niger, capite (inter oculos nigro) thoraceque rubris, elytris luteis, ad basin violaceis. Long. 10 mill. Brésil. — Diffère de *basalis* Pic par le dessous du corps et les cuisses noirs.

A. subfasciatus Germ. A distinguer les var. du Brésil. Elytres jaunes avec des dessins noirs différents de la forme typique (figurée dans la monographie de Klug) soit par la fascie basale divisée (*v. interrupta*), soit par l'absence de macule postérieure (*v. oblitterata*).

Megalopus thoracicus Jac. [Phy.]. A distinguer les var. du Brésil. Elytres foncés, marqués de jaune à la base et au sommet (*v. luteonotatus*), ou testacés avec des bandes raccourcies suturale et latérale foncées nettes (*v. nigrolineatus*). Parfois la coloration claire, jaune ou rouge, s'étend sur la presque totalité de l'insecte (*v. insignata*).

Clytra Nathani n. sp. [Phy.]. Paulo elongatus, nitidus, infra corpore argenteo pubescente, rufo-testaceus, capite inter oculos, scutello et infra corpore nigris, tho-

race nigro bimaculato, elytris in singulo antice paulo oblique nigro bimaculatis, membris testaceis, antennis apice piceis, femoribus pro parte brunneo notatis. Long. 7 mill. Indes Mér. — A placer près de *Duvivieri* Jac.

C. subfasciata n. sp., des Indes, voisin du précédent, est noir, avec la tête et le thorax un peu marqués de roux ; les élytres sont roux et ornés chacun de deux macules noires un peu obliquement disposées avec une large fascie postérieure noire sinuée.

Lema 5-vittata n. sp. [Phy.]. Sat curtus, ruber, antennis, articulo 1° excepto, scutello, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris testaceis, ad suturam, antice latiore, violaceo vittatis, in singulo late violaceo vittatis, vitta postice oblitterata, antice anguste viride marginatis. Long. 6 mill. Tucuman. — Cette gracieuse espèce peut se placer près de *5-lineata* Jac.

L. rubrofasciata n. sp. Oblongo-subparallelus, pro parte ruber, pro parte luteus, antennis, articulo 1° excepto, geniculis, tibiis tarsisque nigris ; capite rubro ; thorace luteo, medio transverse rubro-fasciato ; elytris rubris, in singulo ad basin luteo maculatis, ad et post medium reducte luteo fasciatis, infra corpore rubro. Long. 7 mill. Brésil. — Espèce très caractérisée par sa coloration particulière.

L. flava n. sp. Oblongo-parallelus, flavus, capite, antennis, his apice rufescens, scutello, pectore, tibiis tarsisque nigris, elytris flavis, ad suturam anguste lineatis et post medium externe minute nigro maculatis. Long. 5 mill. Mexique. — Voisin de *Suffrani* Jac., dessins des élytres différents.

L. Laglaisei n. sp. Oblongo-subparallelus, rufus et testaceus, capite, scutello, membris, femoribus pro parte exceptis, pectoreque nigris, elytris testaceis, ad basin late

et reducte nigro lineatis, post medium transverse reducte nigro fasciat. Long. 7 mill. Venezuela. — A placer près de *bifida* Ol.

L. Adonis n. sp. Oblongus, latus, rufus et testaceus, capite, collo excepto, articulo 1^o antennarum, scutello pectoreque nigris, elytris testaceis, ad basin late et reducte violaceo lineatis, linea humeralis intus et infra prolongata, post medium transverse violaceo fasciat, fascia lateraliter oblitterata. Long. 6 mill. Brésil. — Voisin du précédent.

L. albonotata n. sp., du Brésil, voisin de *Adonis*, a la poitrine marquée de flave, les élytres flaves ont leur partie basale largement verte, sauf sur le bord et au milieu, où se trouve une ligne flave sur chaque.

L. curtelineata n. sp. Parum latus, rufus et testaceus, capite, scutello pectoreque nigris, elytris testaceis, antice intus late viridibus, in disco breve luteo lineatis, pre medium paulo oblique viride fasciat, fascia lateraliter oblitterata. Long. 6 mill. Bogota. — A placer près de *ducalis* Lac.

L. fenestrata n. sp., de Colombie, voisin du précédent, a une très petite macule claire incluse dans la large partie verte basale et les tibias sont en partie foncés.

L. viridicollis n. sp. Robustus, viridimetallicus, thorace postice rufo marginato, eyltris luteis, ad suturam et externe apice excepto, anguste violaceo marginatis, ante et post medium violaceo aut rubro-violaceo fasciat. Long. 7 mill. Brésil. — Voisin de *festiva* Guer., plus robuste, avec le dessin des élytres différent.

L. bilunulata n. sp. Sat elongatus, ruber, capite antice membrisque nigris, elytris violaceis, ad suturam antice et externe pro parte rubris, apice luteis, ad basin et ad me-

dium late luteo maculatis. Long. 5 mill. Tucuman. — Voisin du précédent, avec le thorax moins robuste, à bord postérieur non surélevé, etc...

L. excavata n. sp. Curtus et robustus, niger, capite rufo notato, pedibus pro parte elytrisque rubris, his ad medium et postice late nigro maculatis, macula antice ad suturam reducta ; elytris antice fortiter punctatis et impressis, postice striato-punctatis. Long. 4 mill. Brésil. — Caractérisé par la forte sculpture et le dessin des élytres.

Lema semicruciatum n. sp. Minutus, parum latus, testaceus, membris pro parte pectoreque nigris, elytris ad suturam antice reducte nigro vittatis, vitta postice dilatata, ad humeros nigro maculatis, his antice foveolato-impressis. Long. 4 mill. Brésil.

L. Petaini n. sp., du Brésil, voisin du précédent, mais un peu plus allongé, à la poitrine rousse, pas de macule humérale, la bande présuturale noire est rapprochée du sommet, élargie en macules soit en avant, soit postérieurement.

L. instriata n. sp. Oblongus, convexus, rufo-testaceus, capite pro parte, antennis pectoreque nigris, pedibus nigro notatis, elytris post scutellum antice nigro trimaculatis, maculis pro parte juncitis, in singulo post medium oblique nigro maculatis, macula externe reducta ; elytris instriatis, sparse lineato punctatis. Long. 4 mill., Brésil. — Caractérisé par la sculpture et le dessin élytral.

L. Darlani n. sp., du Brésil, voisin du précédent, est noir, avec le thorax, une partie de l'abdomen, la base des fémurs et les élytres testacés, ceux-ci avec une macule humérale et une grande transversale antéapicale noires, en outre suture triangulairement noire à l'apex.

